

Medicina Veterinária

Episiotomia para exérese de fibroleiomioma vaginal em cadela: relato de caso.

Caio Pisani Ferrari - Acadêmico do 9º período do Curso de Medicina Veterinária, DMV/UFLA/Lavras/MG ? caio.ferrari@estudante.ufla.br

André Orfei do Nascimento - Médico Veterinário Residente - Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Animais de Companhia, DMV/UFLA/Lavras/MG ? andreorfei.vet@gmail.com

Amanda do Nascimento Oliveira - Médica Veterinária Residente - Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Animais de Companhia, DMV/UFLA/Lavras/MG ? amanda.n.o@hotmail.com

Brenda Reis Morais Faria - Médica Veterinária Residente - Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Animais de Companhia, DMV/UFLA/Lavras/MG ? brendareis_93@yahoo.com.br

Victória Franciscani Coimbra - Médica Veterinária Residente - Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Animais de Companhia, DMV/UFLA/Lavras/MG ? victoriafcoimbra@gmail.com

Gabriela Rodrigues Sampaio - Gabriela Rodrigues Sampaio - Professora Associada, Orientadora - Setor de Cirurgia Veterinária, DMV/UFLA/Lavras/MG - gabsampa@ufla.br - Orientador(a)

Resumo

Tumores vaginais e vulvares são as neoplasias mais frequentes do trato reprodutivo tubular em cadelas. O leiomioma é uma neoplasia benigna de origem mesenquimal de músculo liso, diagnosticada principalmente em vagina e útero. Possui crescimento lento, não invasiva e não metastática, e pouco vascularizada. Além disso, trata-se de uma neoplasia hormônio dependente, e frequentemente está associada a cistos foliculares ovarianos, tumores secretores de estrógenos, hiperplasia endometrial e hiperplasia e neoplasias mamárias. Quando vaginal ou vulvar, os principais sinais observados são aumento de volume na região perineal, prolapso de tecido através da vulva, disúria, polaciúria, tenesmo, obstrução à cópula e descarga vulvar. A maioria das massas pode ser removida por ressecção via episiotomia associada à ovário-histerectomia, com bom prognóstico, uma vez que a cirurgia tem efeito curativo. O objetivo deste trabalho foi relatar o caso de uma cadela com fibroleiomioma vaginal associado à adenomiose uterina, a qual foi submetida à intervenção cirúrgica para tratamento das afecções. Um canino, fêmea, raça Poodle, com 15 anos de idade, foi atendido pelo Hospital Veterinário da UFLA, com histórico de aparecimento de um nódulo protruído do vestíbulo vaginal, com aparecimento há alguns dias. Ao exame físico foi observada massa firme, cilíndrica e não ulcerada, emergindo da vulva. Foi realizado exame citopatológico, o qual foi sugestivo de leiomioma. O animal também foi submetido ao exame de ultrassonografia abdominal, a qual evidenciou a presença de conteúdo uterino anormal. A paciente foi, então, levada para intervenção cirúrgica, a qual se iniciou pela ovário-histerectomia, seguida pela realização de episiotomia, sondagem uretral e inspeção da vagina para identificação e remoção do nódulo. As peças cirúrgicas foram enviadas para análise histopatológica, a qual confirmou a presença de fibroleiomioma vaginal, associado à adenomiose uterina. O animal encontra-se em completa recuperação. Sendo assim, pode-se inferir que os procedimentos cirúrgicos foram efetivos para a cura das alterações.

Palavras-Chave: cirurgia veterinária, neoplasia vaginal, oncologia.

Instituição de Fomento: Universidade Federal de Lavras

Link do pitch: <https://youtu.be/phC1jFTCKvM>