

Medicina Veterinária

### **Síndrome cólica equina : Relato de caso**

ANNA BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - 7º módulo de Medicina Veterinária, DMV/UFLA

Rodrigo Norberto Pereira - Docente responsável, FZMV/UFLA - Orientador(a)

Isadora Bruno Pinto - Médica Veterinária especialista em Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Grandes Animais, DMV/UFLA

Joicy Servo Nascimento - Médica Veterinária especialista em Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Grandes Animais, DMV/UFLA

Eliel Ariadner Scavazzini Neves - Médico Veterinário especialista em Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Grandes Animais, DMV/UFLA

Lucas Isaac Silveira Barreto - Médico Veterinário especialista em Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Grandes Animais, DMV/UFLA

### **Resumo**

A síndrome cólica equina é um conjunto de alterações gastrointestinais, complexa e multifatorial, considerada uma das principais causas de morbidade e mortalidade em equídeos. Suas causas envolvem peculiaridades anatômicas, como a pequena capacidade gástrica, a impossibilidade de regurgitação e a fragilidade de segmentos intestinais, associados a fatores de manejo, como dieta inadequada, infestações parasitárias e alterações na rotina. O presente trabalho teve como objetivo descrever o caso de um equino macho, Mangalarga Marchador, de 1 ano de idade, pesando 200kg, atendido no Hospital Veterinário da UFLA com síndrome cólica. O objetivo principal foi destacar a importância da observação acurada dos sinais clínicos e a rápida identificação e encaminhamento à clínica cirúrgica. O equino foi submetido ao exame físico completo, hemograma, bioquímico e ultrassonografia. À ultrassonografia, parte do intestino delgado e grosso apresentavam-se distendidos e hipomotílicos. Devido a não responsividade à terapia clínica, o animal foi encaminhado para a clínica cirúrgica e realização de uma celiotomia exploratória. Durante a exploração cirúrgica, identificou-se uma compactação de cólon maior direito, associada à presença de um coprólito em cólon menor. Para correção, foi realizada colotomia na região de flexura pélvica e o coprólito foi ordenhado em direção a ampola retal. O protocolo pós-operatório consistiu em analgesia, antibioticoterapia, anti-inflamatórios, protetor gástrico e hepático, procinéticos e crioterapia preventiva. O animal foi monitorado diariamente até a completa recuperação e alta médica. A síndrome cólica em equinos é uma emergência médica que exige atendimento veterinário imediato e uma avaliação minuciosa. A rápida e correta distinção entre um quadro clínico e quadro cirúrgico é um fator crítico para o sucesso do tratamento e a recuperação do paciente.

Palavras-Chave: Compactação, coprólito, cirurgia.

Instituição de Fomento: ufla

Link do pitch: <https://youtu.be/-SIG3xbBR64>