Medicina Veterinária

Exame Radiográfico no Diagnóstico de Tricobezoar intestinal em Gato Adulto - Relato de caso

Izabela da Silva Abade - Graduanda do 2º período em Medicina Veterinária (UFLA)

Mariana Fernandes de Moura - Graduanda do 2º período em Medicina Veterinária (UFLA)

Ana Luiza Alvarenga Torres - - Residente Diagnóstico por Imagem DMV,UFLA.

Paloma Simão Resende Vaz - Residente Diagnóstico por Imagem DMV,UFLA.

Daniela Fernandes Souza - Residente Diagnóstico por Imagem DMV,UFLA.

Antonio Carlos Cunha Lacreta Júnior - Docente do Departamento de Medicina Veterinária UFLA. - Orientador(a) - Orientador(a)

Resumo

RESUMO O Tricobezoar é um corpo estranho gastroentérico formado por pelos. Em felinos, esse tipo de corpo estranho é comum, devido ao seu hábito de higiene que consiste em lambeduras pelo corpo. Normalmente, as bolas de pelos são expelidas por vômitos, mas, eventualmente pode ocorrer o acúmulo em regiões gástricas e intestinais, causando obstrução. Em casos de obstrução, os principais sinais clínicos apresentados, são anorexia, perda de peso, inapetência, vômitos e dor abdominal.Com o fechamento do diagnóstico, as medidas de intervenção podem ser cirúrgicas endoscópicas ou medicamentosas (pastas orais) a critério do Médico Veterinário responsável. O objetivo do presente resumo é apresentar o diagnóstico de tricobezoar por meio de radiografia contrastada. Foi encaminhado ao setor de Diagnóstico por Imagem do Hospital Veterinário na UFLA, um gato, da raça Maine Coon, de 7 anos de idade, com histórico de vômitos progressivo, perda de peso e prostração. Foi realizada radiografia contrastada, 12ml/kg de sulfato de bário por via oral, nas projeções ventrodorsal, laterolateral esquerda e direita na região abdominal. Na análise radiográfica, imediatamente após a ingestão do contraste, observou-se a passagem normal de todo o conteúdo líquido pelo esôfago cervical e torácico, seguindo pelo preenchimento parcial do fundo gástrico e completo do corpo gástrico e região antro-pilórica, sem evidências de retenção, falhas ou alterações de morfologias em parede e topografia gástrica. Após oito horas e meia, observou-se a presença de uma falha no preenchimento do meio de contraste em terço oral do cólon descendente, associado à presença de materiais heterogêneos, amorfos, e conteúdo gasoso. O animal foi encaminhado para a Médica Veterinária responsável, para a realização do tratamento necessário. Mediante o diagnóstico, foi feito um enema com óleo mineral e solução fisiológica morna, um procedimento indicado para a lavagem intestinal, lubrificação das fezes e facilitação da excreção do conteúdo fecal. O conteúdo excretado após enema consistia de pelos entremeados as fezes, indicando a presença de tricobezoar. Sendo assim, o relato se faz importante na caracterização dos aspectos radiográficos de tricobezoar intestinal para a instituição de um tratamento correto e preciso.

Palavras-Chave: Tricobezoar, Radiografia, Felino.
Instituição de Fomento: Universidade Federal de Lavras

Link do pitch: https://youtu.be/MRpSUvRx1n0