

Zootecnia

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL OURIÇO CACHEIRO (*Sphiggurus villosus*) JOVEM

Tiago Pires Whately - 4º módulo de Zootecnia, UFLA, iniciação científica voluntária

Letícia Guimarães Rufato - 9º módulo de Medicina Veterinária, UFLA, iniciação científica voluntária

Samantha Mesquita Favoretto - Coorientador DMV, UFLA

Antônio Carlos Cunha Lacrete Junior - Orientador DMV, UFLA - Orientador(a)

Resumo

O Ouriço-cacheiro (*Sphiggurus villosus*) é um mamífero roedor que habita as florestas da costa atlântica do Brasil. Espécie arborícola costuma buscar alimentos em árvores pelas quais sobe com facilidade e passa a maior parte de seu dia. Na natureza sua dieta é herbívora, alimentando-se principalmente de folhas, raízes e frutas. Torna-se muito comum a chegada desses animais filhotes em instituições de atendimento à vida silvestre devido a necessidade de ida ao solo terrestre destes animais, momento onde ficam suscetíveis a atropelamentos e ataques de animais domésticos. Um animal da espécie, fêmea, foi encontrado nas dependências da Universidade Federal de Lavras e encaminhado ao Ambulatório de Animais Selvagens. À avaliação, a paciente encontrava-se clinicamente bem, mas carecia de cuidados, por se tratar de uma filhote, aparentemente órfã. Pela fase fisiológica em que se encontrava fora necessário fornecer ao animal uma alimentação líquida. Primeiramente, foi fornecida uma dieta à base de Cereal infantil Mucilon, leite integral, ovo e mel, fornecida por cinco dias. Contudo, esta dieta não foi bem recebida pelo animal que apresentou aumento de volume abdominal e gases. Uma nova dieta foi formulada em uma planilha do Excel e quantificada sobre a necessidade energética 140 ED/kg PC0.75 /dia em estado de crescimento. Para a composição da dieta foram utilizados 100 ml de leite s/ lactose, 94 g de cenoura, 36 g de frutas e 15g de ração de coelho peletizada triturada. Devido a semelhança da dieta natural e da fisionomia do trato gastrointestinal dos ouriços cacheiros com os coelhos domésticos, torna-se possível usar como base para nutrição destes animais os requerimentos nutricionais de coelhos domésticos. O processo de preparo consistiu na mistura dos ingredientes por Mixer para facilitar a consistência da papa. A transição da alimentação líquida para sólida teve uma duração de quinze dias, com a duração de cinco dias para cada fase. A primeira, com o fornecimento da dieta completamente pastosa, a segunda 50% pastosa de 50% sólida, a terceira 25% pastosa e 75% sólida, e finalizando com a dieta sendo fornecida completamente sólida. Durante todo o processo de transição o animal manteve a curva crescente de peso, esperado para um animal em crescimento, frequência e escore fecal foram satisfatórios sobre essa dieta e o animal não apresentou gases.

Palavras-Chave: Dieta, Filhote, Ouriço.

Link do pitch: <https://youtu.be/tyokKEf9tlw>